






















**АНТИРЕТРОВИРУСНИ
МЕДИКАМЕНТИ
ноември 2019**

www.aidsbg.info











Антиретровирусни медикаменти

Лекарствено средство	Изображение	Препоръчителна доза за възрастни	Общ брой таблетки/ капсули дневно
Еднотаблеткови режими (комбинирана терапия в една таблетка)			
Triumeq² (абакавир/ ламивудин/долутегравир, 600 мг/300 мг/50 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Biktarvy^{1,2} (биктегравир/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 50 мг/200 мг/25 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Genvoya¹ (елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 150 мг/150 мг/200 мг/10 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Stribild¹ (елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир дизопроксил, 150 мг/150 мг/200 мг/245 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Dovato^{1,2} (долутегравир/ламивудин, 50 мг/300 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Juluca¹ (долутегравир/рилпивирир, 50 мг/25 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Odefsey^{1,2} (рилпивирир/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 25 мг/200 мг/25 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Eviplera^{1,2} (рилпивирир/емтрицитабин/тенофовир дизопроксил, 25 мг/200 мг/245 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Delstrigo^{1,2} (доравирир/ламивудин/тенофовир дизопроксил, 100 мг/300 мг/245 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Symtuza^{1,2} (дарунавир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 800 мг/150 мг/200 мг/10 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1

Антиретровирусни медикаменти

Лекарствено средство	Изображение	Препоръчителна доза за възрастни	Общ брой таблетки/капсули дневно
НИОТ: Нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (нюкове)			
Единични нюкове			
Епивир² (ламивудин, 300 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Тенофовир дизопроксил³ (245 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1
Retrovir (зидовудин, 100 мг)		3 капсули два пъти дневно	6
Двойни нюкове (комбинирани таблетки)			
Емтрицитабин/тенофовир дизопроксил^{2,3} (200 мг/245 мг)		1 таблетка, веднъж дневно	1
Абакавир/ламивудин³ (600 мг/300 мг)		1 таблетка, веднъж дневно	1
Combivir (зидовудин/ламивудин, 300 мг/150 мг)		1 таблетка, два пъти дневно	2
Descovy^{1,2} (емтрицитабин/тенофовир алафенамид, 200 мг/10 мг или 25 мг)		1 таблетка, веднъж дневно	1
НИИОТ: Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза			
Edurant² (рилпивирин, 25 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Intelence (етравирин, 200 мг)		1 таблетка два пъти дневно; приема се с храна	2
Stocrin (ефавиренц, 200 мг)		3 таблетки веднъж дневно; приемат се вечер преди лягане на гладно	3
Pifeltro^{1,2} (доравирин, 100 мг)		1 таблетка веднъж дневно	1

Антиретровирусни медикаменти

Лекарствено средство	Изображение	Препоръчителна доза за възрастни	Общ брой таблетки/капсули дневно
ИИ: Интегразни инхибитори			
Tivicay² (долутегравир, 50 мг)		1 таблетка веднъж дневно (1 таблетка два пъти дневно при определени обстоятелства)	1 (2)
Isentress² (ралтегравир, 400 мг)		1 таблетка два пъти дневно	2
Isentress HD^{1,2} (ралтегравир, 600 мг)		2 таблетки веднъж дневно	2
ПИ: Протеазни инхибитори			
Rezolsta² (дарунавивир/кобицистат, 800 мг/150 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Дарунавир^{2,3} (800 мг и 600 мг)		1 таблетка x 800 мг + 100 мг ритонавивир веднъж дневно или	2
		1 таблетка x 600 мг + 100 мг ритонавивир два пъти дневно; приема се с храна	4
Reyataz (атазанавир, 300 мг)		1 капсула + 100 мг ритонавивир веднъж дневно; приема се с храна	2
Evotaz¹ (атазанавир/кобицистат, 300 мг/150 мг)		1 таблетка веднъж дневно; приема се с храна	1
Лопинавивир/ритонавивир³ (200 мг/50 мг)		2 таблетки два пъти дневно или 4 таблетки веднъж дневно; приема се с храна	4
Ритонавивир³ (100 мг)		таблетки от 100 мг, прилагани в различни дози за бустирание на други протеазни инхибитори	зависи от протеазния инхибитор, който се бустира
ИН: Инхибитори на навлизането: CCR5-инхибитор			
Celsentri (маравирок)		150 мг, 300 мг или 600 мг два пъти дневно в зависимост от антиретровирусната комбинация	2-4

1 Медикаментите не са налични и не се прилагат у нас.

Забележка: Очаква се еднотаблетковите режими Juluca и Symtuza да бъдат налични у нас след месец май 2020 г.

2 Медикаментите се препоръчват за първа линия терапия.

3 Медикаментите се предлагат у нас от генерични производители и не са представени с действителна снимка, защото се различават по форма, големина и цвят в зависимост от производителя.